

Ibupirac 400

Ibuprofeno 400mg.



Fórmula:

Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 400 mg y excipientes c.s.

Acción Terapéutica:

Antipirético - analgésico - antiinflamatorio no esteroideo.

Indicaciones:

Síndromes febriles de diversa etiología. Dolores agudos: procesos inflamatorios, cefaleas, lumbociática u otros síndromes radiculares. Dolores traumáticos y reumáticos. Neuralgias (incluida herpética). Mialgias. Gota aguda. Parotiditis. Otitis. Mastoiditis. Sinusitis. Odontalgias. Dismenorreas. Mastitis. Dolores post-parto. Tromboflebitis. Algias post-operatorias. Dolores crónicos: Lumbalgias. Artrosis. Poliartritis crónicas. Dolores musculoesqueléticos crónicos. Algias neoplásicas. Periartritis escapulo humeral. Espondilitis anquilosante. Discopatías. Dolores articulares de las colagenopatías. Enfermedad de Paget.

Posología:

Adultos: un comprimido cada 6 a 8 horas.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al Ibuprofeno. Embarazo. Lactancia. Úlcera gastroduodenal severa o en actividad.

Efectos Secundarios:

Raramente pueden aparecer náuseas, ligera dispepsia, dolor epigástrico, diarrea. En estudios comparativos con Ácido acético salicílico e Indometacina, se ha demostrado que a igualdad de dosis efectivas, la incidencia de efectos adversos gastrointestinales disminuye a la mitad en pacientes tratados con Ibuprofeno.

Interacciones Medicamentosas:

Anticoagulantes orales y Heparina:podrían aumentar el riesgo de hemorragia. Litio: el Ibuprofeno puede producir una elevación de los niveles plasmáticos de Litio así como una reducción en su depuración renal. Diuréticos: en algunos pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto natriurético de la Furosemida y de las tiazidas. Antiinflamatorios no esteroideos: pueden aumentar los potenciales efectos adversos propios de esta clase de medicamentos.

Presentación: Envases conteniendo 5 y 10 comprimidos.

Conservar a temperatura ambiente, entre (15 - 30) C.°

Siga correctamente el modo de usar y no desapareciendo los síntomas consulte a su médico.

En caso de intoxicación comunicarse con el CIAT. Tel. (02)1722

Mantener fuera del alcance de los niños.



IBUPIRAC 200 VER



IBUPIRAC 600 VER



IBUPIRAC 800 VER



URUFARMA S.A.

Monte Caseros 3260 - Montevideo - Uruguay - Teléfono 2487 2424

E-mail: depto_medico@urufarma.com.uy

Pág. Web: www.urufarma.com.uy